

# 患者卡

致患者和医疗卫生专业人员的伊赫莱重要安全性信息

## 患者重要须知

与所有药物一样，本品可能引起副作用-您可能只出现部分副作用，也可能出现所有副作用，也可能不会出现任何副作用。有些可能是由于**血糖水平升高（也称为高血糖症）**所致。

- 尽早就医可能防止病情加重。
- 医生可能会监测您血液和尿液中的糖份和酮体水平，并给您开具其他药物，帮助减轻您的症状。
- 处方医生可能会调整您目前使用的本品剂量。

**服用伊赫莱期间，请务必随身携带本卡。每次前往医院就诊时务必向所有为您提供护理的医疗卫生专业人员（包括医生、护士、药师）出示本卡。**

如果您出现以下任何症状，请立即联系医生或寻求帮助：

- **呼吸困难（即，呼吸加快、加重）**
- **恶心和呕吐（持续超过 2 小时）**
- **意识模糊**
- 严重胃疼
- 非常口渴/口干（脱水体征）
- 排尿次数多于平时或排尿量多于平时
- 视物模糊
- 食欲异常增加
- 体重下降
- 呼吸带果味
- 面部潮红和皮肤干燥
- 感觉异常困倦或疲倦



## 医疗卫生专业人员重要须知

此患者正在接受伊赫莱-本品可能引发高血糖症。

- 请评估患者血液和尿液中的糖份和酮体水平。
- 有关高血糖症管理的详细说明，请参阅最新的伊赫莱完整说明书。
- 如果可能，**请联系处方医生**获取更多信息-处方医生可能需要针对伊赫莱进行调整治疗。

有关伊赫莱的更多信息，请阅读伊赫莱的完整说明书。

您还可以通过罗氏热线报告副作用。公司的联系方式:8008208780 (固定电话)或 4008208780 (手机)(人工接听时间:工作日 周一至周五 9:00-17:00)或访问:<http://www.roche.com.cn/>

## 您和您医生的联系信息

(处方医生填写)

开始接受伊赫莱日期:

患者姓名和联系电话:

紧急联系人姓名和电话号码:

初级保健医生姓名和联系电话:

处方医生姓名和联系电话:

处方医生非工作时间联系电话: